T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	CANDEM GÜBRE ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	739
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ-BAKIR EDTA İÇERİKLİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2026TK14154
Marka veya Ticari Adı (varsa)	PLANTACUP
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	CANDEM GÜBRE ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ-BAKIR EDTA İÇERİKLİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bakır(Cu):2,4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu): 2.4
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 L 0,268 - 0,535 - 1,07 - 2,14 - 5,35 - 10,7 - 16,05 - 21,4 - 26,75 - 32,1 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / + 25 °C
Diğer İşaretler	Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Parti Seri No Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No
Veriliş Nedeni	Etiket Düzeltme
Bu belge 01/04/2026 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" geregi piyasaya arz edilen KİMYEVI GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:20/05/2026

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı



NET
HACİM / AĞRILIK

Kullanmadan önce çalkalayınız

Kullanım şekli ve dozu ;
En iyi Konsantrasyon oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. Yapraktan uygulanabilir.
Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.

BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA DOZU
Narenciye / Muz	Meyve oluşumundan sonra uygulanır.Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir. Çiçekli bitkilerde uygulama yapmayınız. Hektara 600-1000 L su kullanımı tavsiye edilir	100-120 mL/100 L Su (107-128,4 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Elma / Armut	Meyve oluşumundan sonra uygulanır. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir. Çiçekli bitkilerde uygulama yapmayınız. Hektara 600-1000 L su kullanımı tavsiye edilir	100-120 mL/100 L Su (107-128,4 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Bağ	Meyve oluşumundan sonra uygulanır. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir. Çiçekli bitkilerde uygulama yapmayınız. Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	100-120 mL/100 L Su (107-128,4 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Şeftali/Kayısı/Erik/Nektarin/Kiraz/Vişne	Meyve oluşumundan sonra uygulanır. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir. Çiçekli bitkilerde uygulama yapmayınız. Hektara 600-1000 L su kullanımı tavsiye edilir	100-120 mL/100 L Su (107-128,4 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Çilek	Meyve oluşumundan sonra uygulanır. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir. Çiçekli bitkilerde uygulama yapmayınız. Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	100-120 mL/100 L Su (107-128,4 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Domates/Biber/Patlıcan	Meyve oluşumundan sonra uygulanır. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir. Çiçekli bitkilerde uygulama yapmayınız. Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	50-70 mL/100 L Su (53,5-74,9 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Hıyar/Kabak/Kavun/Karpuz	Meyve oluşumundan sonra uygulanır. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir.Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	80-100 mL/100 L Su (85,6-107 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Süs Bitkileri	Erken ve Çiçek döneminde uygulanmaz. Her 7-10 günde bir tekrar edilir. Hektara en fazla 1000 L su kullanımı tavsiye edilir	50-70 mL/100 L Su (53,5-74,9 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Fasulye/Baklagiller	İkinci çapadan sonra uygulanır. Her 7-10 günde bir tekrar edilir.Çiçek döneminde uygulanmaz. Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	50-70 mL/100 L Su (53,5-74,9 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Fındık/Antep Fıstığı/İncir	Meyve oluşumundan sonra uygulanır.Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir. Çiçekli bitkilerde uygulama yapmayınız. Hektara 600-1000 L su kullanımı tavsiye edilir	100-120 mL/100 L Su (107-128,4 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Pamuk	Sadece taraklanma ve koza döneminde uygulanır. Çiçek ve hasat dönemine yakın uygulanmaz. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir.Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	80-100 mL/100 L Su (85,6-107 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Patates/Şeker Pancarı/Turp/Havuç/Soğan/ Sarımsak	Erken dönemde ve Çiçek döneminde uygulanmaz. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir.Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	80-100 mL/100 L Su (85,6-107 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Tütün	Erken dönemde ve Çiçek döneminde uygulanmaz. Her 7-14 günde bir uygulama yapılabilir.Hektara 500-800 L su kullanımı tavsiye edilir.	80-100 mL/100 L Su (85,6-107 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir
Zeytin	Meyve oluşumundan sonra, her 7-14 günde bir uygulayınız. Hektara 600-1000 L su kullanımı tavsiye edilir	100-120 mL/100 L Su (107-128,4 g)/100 L Su 1-3 uygulama önerilir

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

CANDEM GÜBRE ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Mah. Çiçekçik Cad. Tadım Plaza
No: 4 Ataşehir / İSTANBUL
Kozyatağı VD. 200 046 9197
Şirket Vekili
Burak Kişin

plantaway
DESIGN YOUR HARVEST

EC FERTILIZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Bakır EDTA İçerikli)

PLANTACUP

Lisans No:
Tescil No:
Üretim/Son Kullanım Tarihi : Ambalaj Üzerinde yazmaktadır.
Parti/Seri No. : Ambalaj Üzerinde yazmaktadır
Net Ağırlık/Hacim :

Garanti edilen içerik	**w/w**
Suda çözünür Bakır (Cu	%2,4
EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu).	%2,4
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu)	2-11





Karışabilirlik ;
Kullanmadan önce ufak bir deneme yapmanız tavsiye edilir.
Henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları,ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Plantaway Netherlands B.V. firması oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir Önerilenin haricindeki uygulamalardan kaynaklanan olumsuzluklardan firmamız sorumlu değildir.

Kullanımda Güvenlik Kuralları ve ilk yardım ;
Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz
Göz ve deri temasında , ayrıca teneffüs edildiğinde tahrişe yol açabilir
Teneffüs etmeyiniz.
Göz temasında, gözlerinizi derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz
Koruyucu elbise, eldiven , gözlük ve yüz maskesi kullanınız! Tahriş Edici
Kaza durumlarında veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal doktora danışınız
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Uygun Depolama Şartları
Serin ve kuru yerlerde saklayınız.
Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Normal şartlar altında en az 3 yıl süre ile kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama Sıcaklığı : 0°C / +25°C

Üretici/ İhracatcı Firma
Plantaway Netherlands B.V.
Tobias asserlaan 7, K 1.282 2662SB
BERGSCHENHOEK/NETHERLANDS
www.plantaway.com / info@plantaway.com

İthalatçı Firma:
Candem Gübre Anonim Şirketi
Atatürk Mahallesi Çitlembik Cad. Tadım plaza No:4
Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: + 90 332 342 00 01
Fax: + 90 332 342 13 86

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

CANDEM GÜBRE ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Mah. Çitlembik Cad. Tadım Plaza
No: 4 Ataşehir / İSTANBUL
Kozyatağı VD. 200 046 9197
Şirket Vekili
Burak İdişin